

Onligol®

Macrogol 4000

AD AZIONE LASSATIVA IL PRIMO MACROGOL SENZA ELETTROLITI E SENZA AROMA CHE SI SCIOLGIE IN QUALSIASI BEVANDA, ANCHE CALDA (es. tè, tisane, latte, brodo o succo di frutta)

20 bustine da 10 g
Macrogol 4000

Onligol svolge la sua azione in modo naturale; non viene assorbito né fermenta nell'intestino, non irrita la mucosa e viene eliminato nelle feci in forma non modificata.

COME SI PRESENTA?

Onligol è un lassativo in polvere per soluzione orale a base di Macrogol 4000. Non contiene eccipienti né aromatizzanti. La confezione contiene 20 bustine monouso. Ogni bustina contiene 10 g di Macrogol 4000. Onligol è disponibile anche nelle confezioni in flacone da 400 g e in flacone da 200 g con cucchiaino dosatore.

A COSA SERVE?

Onligol è particolarmente indicato nella stitichezza cronica: è ugualmente indicato nel caso di intestino occasionalmente irregolare.

COME AGISCE?

Grazie alla sua affinità per l'acqua, Onligol ammorbidisce le feci facilitando l'evacuazione. In questo modo favorisce un senso di benessere e sollievo. Non provoca né crampi, né dolore addominale, né condizioni di urgenza. La sua efficacia non si riduce nel tempo.

COME SI USA?

Sciogliere Onligol mescolando la polvere in una qualsiasi bevanda. Il contenuto di una bustina (10 g) va disciolto in almeno 125 ml (aumentare a 150 ml in età pediatrica) di qualsiasi bevanda anche calda, come tè, tisane, latte, brodo o succo di frutta. Onligol non altera il gusto della bevanda. Bere la soluzione così ricostituita. Si consiglia di assumere Onligol lontano dai pasti.

QUANTO NE SERVE?

(salvo diversa prescrizione medica):

Onligol, per le sue caratteristiche di sicurezza, consente un'ampia flessibilità di dosaggio.

Adulti e bambini di peso superiore ai 20 kg:

La dose è di 10 g (1 bustina), 1-3 volte al giorno, secondo la risposta individuale. Per ottenere un effetto più rapido, la dose massima giornaliera (30 g) può essere assunta in un'unica somministrazione. In caso di uso prolungato, la dose può essere ridotta a 10 g (1 bustina) 1-2 volte al giorno, anche a giorni alterni, preferibilmente la sera.

Bambini fino a 20 kg:

Il dosaggio va commisurato al peso corporeo. Si consiglia pertanto l'uso della confezione in flacone da 200 g di polvere con cucchiaino dosatore che consente di personalizzare la dose in funzione delle reali esigenze del bambino fino ad ottenere feci morbide.

Non superare il dosaggio massimo giornaliero di 30 g.

QUANDO NON USARLO?

Non assumere Onligol in caso di: ipersensibilità nota a macrogol; perforazione e/o ostruzione gastrointestinale. In gravidanza ed allattamento il prodotto va usato dietro prescrizione medica.

POSSO PRENDERE ONLIGOL SE STO ASSUMENDO FARMACI?

Sì, non sono note interazioni con farmaci ma è opportuno che l'assunzione del prodotto sia distanziata di almeno 2 ore da quella di farmaci orali.

POSSONO MANIFESTARSI EFFETTI INDESIDERATI?

Occasionalmente distensione addominale e/o nausea che si risolvono continuando l'uso. Casi rari di reazioni allergiche (rash, orticaria): in questo caso sospendere l'uso del prodotto ed informare il proprio medico o farmacista.

COSA ACCADE IN CASO DI SOVRADOSAGGIO?

Può manifestarsi diarrea che si risolve, spontaneamente, con la sospensione del prodotto.

QUALI SONO LE AVVERTENZE D'USO?

Conservare nella confezione originale in luogo fresco ed asciutto. La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro e correttamente conservato.

TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI SENZA ZUCCHERO

Smaltimento

Il dispositivo scaduto o comunque da eliminare deve essere gestito come da regolamento di gestione dei rifiuti dell'Ente Gestore Locale. Non disperdere in nessun caso il prodotto o la sua confezione nell'ambiente Rev. 05 del 05/2017

Distributore: Alfaisigma S.p.A. - Viale Sarca, n. 223 - 20126 Milano (MI)



Fabbricante: SIIT Srl Via Ariosto, 50/60 - 20090 Trezzano s/N (MI)



ALFASIGMA