

## **LOVOL – esse**

**AL GUSTO AGRUMI**

4 buste da 64,5 g

Preparato isotonic per la pulizia dell'intestino con SIMETICONE

### **Che cos'è LOVOL-esse e a cosa serve?**

LOVOL-esse è un preparato in polvere per la preparazione di una soluzione orale, da assumere per ottenere una semplice ed efficace pulizia dell'intestino. La rimozione dei residui solidi in tutto il colon (grosso intestino) è fondamentale per una diagnosi accurata. Il prodotto contiene macrogol 4000, una sostanza inerte che non viene assorbita, non irrita la mucosa, non fermenta e viene eliminata in forma non modificata.

I sali presenti nel prodotto rendono la soluzione isotonica, per mantenere inalterato l'equilibrio idro-salino dell'organismo e garantire una elevata sicurezza d'uso. La presenza di simeticone, una sostanza anti-gas, riduce la sensazione di gonfiore nello stomaco e nell'intestino. L'aroma agrumi rende più gradevole l'assunzione del preparato. LOVOL-esse è indicato in tutte le condizioni che richiedono una preparazione dell'intestino prima di esami diagnostici del colon o di interventi chirurgici.

### **Come si presenta LOVOL-esse?**

LOVOL-esse si presenta in buste il cui contenuto va sciolto in acqua per la preparazione di una soluzione orale.

La confezione contiene 4 buste da 64,5 g di polvere ciascuna.

### **Come si usa LOVOL-esse?**

Per una preparazione ottimale e completa ad esami diagnostici quali, ad esempio, la colonscopia, è necessario che lei segua scrupolosamente le istruzioni che le verranno fornite dal Centro ove effettuerà l'esame.

Queste prevedono di regola, un regime dietetico controllato nei giorni che precedono l'esame e l'assunzione di 2-4 compresse di bisacodile (10-20 mg) quattro ore prima di iniziare a bere LOVOL-esse. Il contenuto di ogni busta di LOVOL-esse va disciolto in 500 ml di acqua. Raffreddi la soluzione in frigorifero per renderne l'assunzione più gradevole.

Beva il primo litro di LOVOL-esse nell'arco di 1 ora o 1 ora e ½. Cerchi di bere 2 bicchieri da tavola (circa 250 ml) ogni 15-20 minuti. Dopo il primo litro è possibile prendere una pausa non superiore ad 1 ora.

Beva quindi il secondo litro con le stesse modalità con cui ha assunto il primo. Per un'adeguata pulizia dell'intestino le raccomandiamo di assumere tutti i due litri di soluzione.

### **Cosa ci si deve aspettare dopo l'assunzione di LOVOL-esse?**

Di regola, dopo l'assunzione del primo litro, lei comincerà ad avvertire movimenti intestinali e stimolo all'evacuazione.

Ciò è del tutto normale ed è segno che il preparato sta agendo.

Le evacuazioni saranno progressivamente più liquide, finché sarà emesso solo liquido chiaro. Questo indica che la pulizia è stata completata correttamente e che lei è pronto/a per effettuare l'esame.

L'effetto di LOVOL-esse non si accompagna generalmente a disturbi e dolori addominali.

### **Quando non usare LOVOL-esse**

Non assuma LOVOL-esse in caso di:

- ipersensibilità nota verso uno dei componenti del prodotto;
- forme occlusive o stenotiche dell'intestino;
- stasi gastrica;
- ileo dinamico;
- perforazione gastrointestinale;
- colite acuta grave;
- megacolon tossico.

In gravidanza ed allattamento il preparato va somministrato sotto il diretto controllo medico. L'uso di LOVOL-esse non è consigliato nei bambini al di sotto dei 2 anni.

### **Posso continuare ad assumere le mie terapie mediche durante la preparazione con LOVOL-esse?**

Lei può continuare le terapie in corso, evitando di assumere i farmaci per via orale nell'intervallo che va da 1 ora prima della assunzione di LOVOL-esse fino alla cessazione delle evacuazioni.

Se lei assume anticoagulanti, antiaggreganti o farmaci per il diabete, consulti il proprio Medico o il Centro di Endoscopia per un'eventuale variazione della posologia.

### **Possono manifestarsi effetti indesiderati?**

Prima dell'evacuazione, possono presentarsi nausea, gonfiore e distensione addominale. Se questi sintomi diventano intensi, le consigliamo di assumere il prodotto più lentamente, in tal modo i sintomi si riducono. Casi rari di reazioni allergiche (rash, orticaria): in questo caso informi il proprio medico o farmacista.

### **Quali sono le avvertenze d'uso?**

- Non aggiungere altri ingredienti alla soluzione ricostituita.
- La soluzione ricostituita deve essere consumata entro 24 ore.
- La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro e correttamente conservato.
- **TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI.**

### **Composizione**

Macrogol 4000, acido citrico, sodio citrato, sodio cloruro, potassio cloruro, simeticone; antiagglomerante: biossido di silicio; edulcorante: acesulfame k, aroma arancia.

#### **Una bustina contiene:**

Sodio	500	mg
Macrogol 4000	60743	mg
Cloro	476	mg
Potassio	100	mg

Rev. 03 del 09/2013  
SENZA ZUCCHERO  
DISPOSITIVO MEDICO

### **Smaltimento**

Il dispositivo scaduto o comunque da eliminare deve essere gestito come da regolamento di gestione dei rifiuti dell'Ente Gestore Locale.

Non disperdere in nessun caso il prodotto o la sua confezione nell'ambiente



Distributore: Alfa Wassermann S.p.A.- via E. Fermi, 1 - 65020 Alanno (PE) – Italia



Fabbricante: SIIT Srl Via Ariosto, 50/60 – 20090 Trezzano s/N (MI)

CE 0426

